

© GESS: German Expert Panel Peristomal Skin Lesion; 2015
 Runkel N, Droste W, Reith B, Jehle E, Benz S, Birk M,
 Staib G, Romankiewicz J, Hartkopf F, Jooß M

LSD-Score: Kurzversion

L = Läsion der Stoma- umgebenden Haut	S = Status der Stoma- Versorgung	D = (Disease) System- erkrankungen
L0 keine	S0 sicher und einfach	D0 keine
L1 Effloreszenzen im Hautniveau	S1 erhöhter Aufwand	D1 ohne Einfluss
L2 erhabenen Läsionen oder Defekte	S2 unsicher trotz erhöhtem Aufwand	D2 mit Einfluss
L3 Infektion	S-Zusatz Stoma-Pathologie O Ostomie-Stenose R Retraktion P Prolaps H Hernie E (Edema) Ödem oder Nekrose der Darmschleimhaut US ungünstige Stomaposition	

Abbildung 1: Therapie-Algorithmus

L0	↔	Keine Änderung
L1,2	↔	Stomatherapie intensivieren; nach Ursache in der Versorgung oder in der Haut suchen, ggf. Vorstellung beim Dermatologen mit Expertise für die peristomale Haut
L3	↔	Stomatherapie intensivieren und nach Ursache in der Versorgung suchen, Vorstellung beim Viszeralchirurgen mit Expertise in der Stomachirurgie
L1-2, S0	↔	Pflegeexperte Stoma konsultieren
S1	↔	Versorgung durch Pflegeexperten Stoma
S2	↔	Vorstellung in einer viszeralchirurgischen Klinik mit Expertise in der Stomatherapie
D2	↔	Konsultation des behandelnden Arztes zur Modifikation der Systemtherapie
S-Zusatz ORPHEUS	↔	intensivierte Versorgung durch Pflegeexperten Stoma und Vorstellung beim Viszeralchirurgen mit Expertise in der Stomachirurgie

Weitere Informationen und die PDF zum Download auf: www.fgskw.org